

ALGIMUN

Το ALGIMUN® βασίζεται στην πατενταρισμένη μοναδική τεχνολογία της OLMIX για την παραγωγή συγκεκριμένων εκχυλισμάτων φυκιών MSP® (Marine sulphated polysaccharides) πλούσια σε beta glucans

Σε έναν συνδυασμό δύο βιολογικά ενεργών εκχυλισμάτων φυκιών: Το MSP®IMMUNITY, από πράσινα φύκια (Ulva sp.) που ρυθμίζει έμφυτες και προσαρμοστικές ανοσολογικές αποκρίσεις και το MSP®BARRIER από κόκκινα φύκια (Solieria chordalis) που ενισχύει τη λειτουργία του εντερικού φραγμού του πεπτικού επιθηλίου

Τρόπος Δράσης ALGIMUN®

Αύξηση της προστασίας του εντέρου

Ενίσχυση των δεσμών των κυττάρων του βλεννογόνου του εντέρου.


Το MSP®BARRIER

διεγείρει τις υπεύθυνες πρωτεΐνες για σφιχτή σύνδεση των κυττάρων (CLDN2,Zo-1)

Βελτιωμένη λειτουργία της βλέννας:

Το MSP®BARRIER προκαλεί διέγερσή των κυττάρων που παράγουν τη βλέννα (MUC2&MUC4).

Έτσι εμποδίζεται η διείσδυση παθογόνων και τοξινών



Ενίσχυση του Ανοσοποιητικού

Το MSP®IMMUNITY διεγείρει :

- την κυτταρική και χυμική ανοσία.
- Τον Πολλαπλασιασμό κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος
- Τον Πολλαπλασιασμό και διαφοροποίηση των λεμφοκυττάρων

Ενισχύει την ανοσολογική ανοχή και την αντιφλεγμονώδη δράση

Βελτιώνει την αποτελεσματικότητα του ανοσοποιητικού έναντι των μικροοργανισμών

Με τον τρόπο αυτό υπάρχει μια συνεργική δράση με αποτέλεσμα την αυξημένη ακεραιότητα του εντερικού φραγμού και την ενεργοποίηση των κυττάρων του ανοσοποιητικού

Χορηγείται στην τροφή:

1.Στις χοιρομητέρες στην φάση πρόγαλουχίας και γαλουχίας 2 kg και 1kg στην ξηρή

Περίοδο.

2.Θηλάζοντα και απογαλακτισμένα χοιρίδια 1-2 κιλά.

3.Παχυνόμενοι χοίροι 1κιλό

4.Στις αγελάδες χορηγείται στην τροφή 20γρ. τη μέρα κατά της θερμικής καταπόνησης και τους 3 πρώτους μήνες γαλουχίας μειώνει τα περιστατικά μαστίτιδων κατά 80% και αυξάνει την γαλακτοπαραγωγή κατά 2 %.

5. Στα κοτόπουλα χορηγείται στην τροφή 0,5- 1 κιλό στον τόνο τροφής και βελτιώνει την μετατρεψιμότητα 2-3 μονάδες (1,68 σε 1,65) και τη ΜΗΑ 1,2γρ τη μέρα, μειώνει τις πιθανότητες εμφάνισης νεκρωτικής εντερίτιδας.

6.Στις κόττες αυγοπαραγωγής μειώνει τις απώλειες έως και 50%, βελτιώνει την αυγοπαραγωγή 0,5% και την εκκολαπτικότητα έως 2%. Χορηγείται στην τροφή 0,5- 1 κιλό στον τόνο τροφής



ΚΑΛΟΡΙΖΟΥ | ΚΟΥΡΟΥΠΙΔΗΣ

7ο χλμ. ΕΠΟ Καρδίτσας-Καλλίθνηρου
Αρ. Τεμ. 327 0, 43150 Καρδίτσα

Τ: 2441073034, 2441041951

Κ: 6972329756

www.vkk.gr • info@vkk.gr