



Tonisity Px

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγίες ανάμειξης:

- Αναμείξτε 310 g (2 κοφτές μεζούρες των 155 g) Tonisity Px με 10 L φρέσκο νερό για παρασκευάσετε ένα υγρό διάλυμα Tonisity Px 3%.
- Για καλύτερα αποτελέσματα, προσθέστε το Tonisity Px μέσα σε νερό και ανακατέψτε έως ότου διαλυθεί η σκόνη.
- Παρασκευάζετε φρέσκια τροφή καθημερινά και χρησιμοποιείτε καθαρά σκεύη ταΐσματος για τη χορήγηση.



Για ακριβή ανάμειξη, χρησιμοποιήστε τη μεζούρα Tonisity Px για τη μέτρηση της σωστής ποσότητας σκόνης.



+



=

3%

Σημαντικά σημεία

- Για την ανάμειξη του διαλύματος Tonisity Px χρησιμοποιείτε πάντα φρέσκο πόσιμο νερό.
- Αναμειγνύετε αρκετή ποσότητα διαλύματος μόνο για ένα ταΐσμα τη φορά.
- Προσθέστε τη σκόνη σε νερό (περίπου 25 °C) και ανακατέψτε ήπια έως ότου διαλυθεί πλήρως, χρησιμοποιώντας συρμάτινο αναδευτήρα ή παρόμοιο εργαλείο.
- Μη χρησιμοποιείτε καυτό νερό (άνω των 40 °C).
- Πλένετε, ξεπλένετε και απολυμαίνετε τα σκεύη μετά από κάθε ταΐσμα.





ΣΥΜΒΟΥΛΗ:

Για να ενθαρρύνετε την κατανάλωση του διαλύματος κατά την Ημέρα 2, βυθίστε τη μύτη μερικών χοιριδίων μέσα στο διάλυμα. Αυτά θα διδάξουν τον τρόπο πόσης στα υπόλοιπα χοιρίδια.

1 Θηλασμός :

Από τη 2η μέχρι την 8η ημέρα της ζωής, χορηγήστε 500 ml διαλύματος Tonisity Px 3% ανά τοκετοομάδα ανά ημέρα (ή 40 ml/χοιρίδιο/ημέρα)

2 Εισαγωγή τροφής εθισμού :

Για τις πρώτες 3 ημέρες χορήγησης τροφής εθισμού, μουσκέψτε την τροφή εθισμού 20 ml διαλύματος Tonisity Px για κάθε 100 gr τροφής

3 Μετάβαση κατά τον απογαλακτισμό :

Για 3 ημέρες πριν τον απογαλακτισμό χορηγήστε 500 ml διαλύματος/τοκετοομάδα ημέρα ή 40 ml διαλύματος/χοιρίδιο/ημέρα πάνω στην τροφή εθισμού

Για 3 ημέρες μετά τον απογαλακτισμό χορηγήστε μέχρι 100 ml διαλύματος/χοιρίδιο/ημέρα πάνω στην τροφή εθισμού

4 Ενυδάτωση κατά τη μεταφορά :

Για πρόσφατα απογαλακτισθέντες χοίρους ακολουθήστε το πρωτόκολλο μετάβασης απογαλακτισμού

Για αναπτυσσόμενους - παχυνόμενους χοίρους χορηγήστε 100 ml διαλύματος ανά 10 kg ζώντος βάρους, για 1-2 ημέρες πριν και μετά τη μεταφορά

Προληπτικά μέτρα:

- Βεβαιωθείτε ότι τα χοιρίδια έχουν πρόσβαση σε καθαρό, φρέσκο νερό ανά πάσα στιγμή.
- Πριν από το τάισμα, βεβαιωθείτε ότι τα σκεύη είναι καθαρά.
- Τοποθετήστε το σκεύος ταΐσματος σε έναν χώρο όπου τα χοιρίδια μπορούν να έχουν εύκολη πρόσβαση (κοντά στη φωλιά ή τις ποτίστρες) και όχι σε μια κρύα ή βρώμικη γωνία.
- Εάν έχει απομείνει προϊόν στα σκεύη μετά από μισή ημέρα, χορηγήστε το στις χοιρομητέρες.
- Η επεξεργασία των υπόγειων υδάτων με χλώριο μπορεί να είναι ακανόνιστη. Ένα υψηλό ποσοστό χλωρίου στο νερό θα επηρεάσει αρνητικά την γεύση του διαλύματος Tonisity Px.

Αποθήκευση και χειρισμός:

- Αποθήκευση: Αποθηκεύετε τη σκόνη Tonisity Px σε θερμοκρασία κάτω των 30 °C (θερμοκρασία δωματίου) σε καθαρό, ξηρό περιβάλλον.
- Μην εκθέτετε σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή υγρασία.
- Για να διατηρήσετε τη φρεσκάδα, μετά το άνοιγμα, κρατήστε τις μερικώς χρησιμοποιημένες συσκευασίες ερμητικά κλειστές.

Πρακτική τήρησης προσοχής

Οι οδηγίες χρήσης πρέπει να ακολουθούνται προσεκτικά. Το Tonisity Px δεν προορίζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο.

Συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα www.tonisity.com ή επικοινωνήστε με τον τοπικό μας αντιπρόσωπο για περισσότερες πληροφορίες.

16 Fitzwilliam Place, Dublin 2, Ireland

T: +353 (0)1 902 0026 **E:** orders@tonisity.com **W:** tonisity.com

To Tonisity Px™ είναι εμπορικό σήμα της Tonisity Int. Ltd. ©2018 Tonisity International Ltd. PX-18-03-METRIC

To Tonisity Px είναι ένα ισοτονικό συμπλήρωμα διατροφής που έχει σχεδιαστεί ειδικά για χοίρους. Δεν αποτελεί φάρμακο και δεν περιέχει συστατικά με ιδιότητες όμοιες με εκείνες των φαρμάκων. Δεν προορίζεται για τη διάγνωση, την αντιμετώπιση, τη θεραπεία ή την πρόληψη οποιασδήποτε ασθένειας. Τυχόν διαφορές στην απόδοση οφείλονται στις διατροφικές και ενυδατικές ιδιότητες του Tonisity Px.